

AQ-10 (версия за възрастни - самооценъчна)

Коефициент за аутистично разстройство

Кратко оценяване на поведението при съмнение за аутистично разстройство.

Моля, отбележете само по един отговор на всяко твърдение:

Напълно
съгласен

По-скоро
съгласен

По-скоро
несъгласен

Напълно
несъгласен

1	Често регистрирам шумове, които не правят впечатление на останалите хора.				
2	Обикновено се концентрирам по-скоро върху цялата картина, отколкото върху отделни детайли.				
3	Лесно ми е да правя няколко неща едновременно.				
4	Ако има прекъсване, много бързо мога да се върна към това, което съм правел.				
5	Лесно „чета между редовете“, когато някой ми говори.				
6	Знам как да разбера дали някой, който ме слуша, се отегчава.				
7	Когато чета история, ми е трудно да разбера намеренията на героите.				
8	Обичам да събирам информация за различни категории неща (напр. видове автомобили, птици, влакове, растения и т. н.).				
9	Лесно разбирам какво мисли или чувства човек, само като погледна лицето му.				
10	Трудно ми е да разбера намеренията на хората.				

Изчисляване на резултат: Отговор „Напълно съгласен“ или „По-скоро съгласен“ на **айтеми 1, 7, 8 и 10** получава 1 точка. Отговор „Напълно несъгласен“ или „По-скоро несъгласен“ на **айтеми 2, 3, 4, 5, 6 и 9** се оценява с 1 точка. Когато **общият сбор е 6 точки или повече** се препоръчва насочване към специалист за диагностично оценяване.

Приложение: Тази версия на теста е препоръчана в ‘Autism: recognition, referral, diagnosis and management of adults on the autism spectrum’ (NICE clinical guideline CG142). www.nice.org.uk/CG142

Източник: Allison C, Auyeung B, and Baron-Cohen S, (2012). *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry* 51(2):202-12.

Autism Spectrum Quotient (AQ) - Allison, C. Auyeung, B. & Baron-Cohen, S. (2012) (Превод на български: Д. Маслинкова, С. Стайкова, А. Аврамова, Н. Полнарева, Клиника по детска психиатрия „Св. Никола“, УМБАЛ „Александровска“, 2022)

