

# AQ-10 (версия за деца - 4 – 11 години)

## Коефициент за аутистично разстройство

Кратко оценяване на поведението на деца на възраст от 4 до 11 г. при съмнение за аутистично разстройство. Оценката се извършва от родител/ възрастен, ангажиран с отглеждането на детето.

Моля, отбележете само по един отговор на всяко твърдение:

Напълно съгласен

По-скоро съгласен

По-скоро несъгласен

Напълно несъгласен

	Напълно съгласен	По-скоро съгласен	По-скоро несъгласен	Напълно несъгласен
1	Често регистрира шумове, които не правят впечатление на останалите хора.			
2	Обикновено се концентрира по-скоро върху цялата картина, отколкото върху отделни детайли.			
3	В група успява лесно да следи разговорите между няколко участника.			
4	Лесно преминава от една дейност в друга.			
5	Не знае как да поддържа разговор с връстници.			
6	Добър/а е в леки социални разговори.			
7	Когато чете история, трудно разбира намеренията или чувствата на героите.			
8	В предучилищна възраст обичаше да играе „на ужким“ с други деца.			
9	Лесно разбира какво мисли или чувства човек, само като погледне лицето му.			
10	Трудно се сприятелява.			

**Изчисляване на резултат:** Отговор „Напълно съгласен“ или „По-скоро съгласен“ на айтеми **1, 5, 7 и 10** получава 1 точка. Отговор „Напълно несъгласен“ или „По-скоро несъгласен“ на айтеми **2, 3, 4, 6, 8 и 9** се оценява с 1 точка. Когато общият **сбор е 6т. или повече** детето следва да бъде насочено към специалист за диагностично оценяване.

**Приложение:** Тази версия на теста е препоръчана в NICE clinical guideline CG142. [www.nice.org.uk/CG142](http://www.nice.org.uk/CG142)

**Източник:** Allison C, Auyeung B, and Baron-Cohen S, (2012). *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry* 51(2):202-12.

Autism Spectrum Quotient (AQ) - Allison, C. Auyeung, B. & Baron-Cohen, S. (2012) (Превод на български: Д. Маслинкова, С. Стайкова, А. Аврамова, Н. Полнарева, Клиника по детска психиатрия „Св. Никола“, УМБАЛ „Александровска“, 2022)

